

除草剤

バスタ[®]液剤

[®]=BASF社の登録商標

除草剤分類 **10**

有効成分

グルホシネート 18.5%

登録番号：第20958号

性 状：青緑色澄明水溶性液体

毒 性：普通物*

有効年限：4年

包 装：500ml×20本

1ℓ×12本

2.2ℓ×6本(系統のみ)

5ℓ×4本

10ℓ×2本(系統のみ)

*普通物：毒劇物に該当しないものを指している通称

バスタ液剤の詳細については、特設サイト(<https://www.basta.jp/>)でもご覧いただけます。

■適用雑草と使用方法

(2020年7月8日現在)

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グルホシネート及びグルホシネートPを含む農薬の総使用回数	
				薬量	希釈水量				
小麦	—	一年生雑草	は種前 (雑草生育期)	300~ 750ml /10a	100~ 150ℓ /10a	1回	雑草 茎葉 散布	4回以内 (は種後は3回以内)	
	圃場内の 周縁部		は種後出芽前 (雑草生育期)	300~ 500ml /10a					3回以内
大麦	—		は種前 (雑草生育期)			300~ 500ml /10a			1回
	圃場内の 周縁部		は種後出芽前 (雑草生育期)						
	圃場内の 周縁部		収穫7日前まで (雑草生育期)						
そば	—		は種前 (雑草生育期)	300~ 500ml /10a		1回			3回以内
	圃場内の 周縁部	は種後出芽前 (雑草生育期)							
	圃場内の 周縁部	収穫前日まで (雑草生育期)							

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グルホシネート及びグルホシネートPを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
かんきつ りんご	—	一年生雑草	収穫21日前まで (雑草生育期: 草丈30cm以下)	300～ 500mℓ /10a	100～ 150ℓ /10a	3回以内	雑草 茎葉 散布	3回以内
		多年生雑草		500～ 1000mℓ /10a				
ぶどう なし おうとう かき もも 小粒核果類 ネクタリン ブルーベリー		一年生雑草	収穫前日まで (雑草生育期: 草丈30cm以下)	300～ 500mℓ /10a				
		多年生雑草		500～ 1000mℓ /10a				
いちじく		一年生雑草	収穫21日前まで (雑草生育期: 草丈30cm以下)	300～ 500mℓ /10a				
びわ キウイフルーツ		多年生雑草		500～ 750mℓ /10a				
		いちよう (種子)	一年生雑草	収穫14日前まで (雑草生育期: 草丈30cm以下)		300～ 500mℓ /10a		
多年生雑草			500～ 1000mℓ /10a					
くり		一年生雑草	収穫30日前まで (雑草生育期: 草丈30cm以下)	300～ 500mℓ /10a				
		多年生雑草		500～ 750mℓ /10a				
キャベツ はくさい	一年生雑草	収穫45日前まで (雑草生育期 定植前又は 畦間処理)	300～ 500mℓ /10a	2回以内				
きゅうり なす ピーマン とうがらし類 トマト ミニトマト いちご		収穫前日まで (雑草生育期 定植前又は 畦間処理)		3回以内				
		2回以内						
すいか ねぎ たまねぎ ブロッコリー ズッキーニ にがうり		2回以内						

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グルホシネート及びグルホシネートPを含む農薬の総使用回数	
				薬量	希釈水量				
だいこん	—	一年生雑草	収穫45日前まで (雑草生育期は種前又は畦間処理)	300～500mℓ/10a	100～150ℓ/10a	雑草茎葉散布	2回以内	2回以内	
はつかだいこん たかな ほうれんそう			収穫7日前まで (雑草生育期は種前又は畦間処理)						3回以内
みつば みしまさいこ			収穫30日前まで (雑草生育期定植前又は畦間処理)						
メロン レタス 非結球レタス かぼちゃ			収穫前日まで (雑草生育期は種前又は畦間処理)						3回以内
ごぼう			収穫前日まで (雑草生育期萌芽前又は畦間処理)						
にんじん オクラ			収穫打切り後 (雑草生育期)						3回以内
アスパラガス			収穫30日前まで (雑草生育期植付前又は畦間処理)						
さといも やまのいも			収穫14日前まで (雑草生育期挿苗前又は畦間処理)						2回以内
かんしょ			雑草生育期植付前又は植付後萌芽前						
こんにゃく			収穫30日前まで (雑草生育期畦間処理)						3回以内
ばれいしょ			雑草生育期植付前又は植付後萌芽直前	1回					
			収穫21日前まで (畦間処理:雑草生育期)	2回以内					

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グルホシネート及びグルホシネートPを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
豆類 (種実、ただし、 だいずを除く)	—	一年生雑草	は種前 (雑草生育期)	300～ 500mℓ /10a	100～ 150ℓ /10a	3回以内	雑草 茎葉 散布	3回以内
			定植5日前まで (雑草生育期)					
			収穫28日前まで (畦間処理: 雑草生育期)					
は種前 (雑草生育期)								
は種後出芽前 (雑草生育期)								
定植5日前まで (雑草生育期)								
収穫28日前まで (畦間処理: 雑草生育期)								
収穫28日前まで (株間処理: 本葉5葉期以降 雑草生育期)								
は種前 (雑草生育期)								
は種後出芽前 (雑草生育期)								
定植5日前まで (雑草生育期)								
えだまめ			収穫14日前まで (畦間処理: 雑草生育期)					
なばな類	収穫21日前まで (雑草生育期 は種・定植前又は 畦間処理)							
かぶ	は種前 (雑草生育期)	2回以内	2回以内					
	定植前 (雑草生育期)							
	収穫21日前まで (畦間処理: 雑草生育期)							

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グルホシネート及びグルホシネートPを含む農薬の総使用回数					
				薬量	希釈水量								
にら さやいんげん さやえんどう 実えんどう 未成熟そらまめ	—	一年生雑草	は種前 (雑草生育期)	300～ 500mℓ /10a	100～ 150ℓ /10a	2回以内	雑草 茎葉 散布	3回以内					
			定植前 (雑草生育期)						3回以内	2回以内			
			収穫前日まで (畦間処理: 雑草生育期)								1回		
			しろうり									1回	
ほうきぎ			3回以内						3回以内				
にんにく			2回以内						2回以内				
しょうが			3回以内						3回以内				
葉しょうが			3回以内						3回以内				
食用ぎく			は種前 (雑草生育期)						100～ 150ℓ /10a		2回以内	雑草 茎葉 散布	2回以内
			定植前 (雑草生育期)										
	収穫14日前まで (畦間処理: 雑草生育期)												
	水田作物	1回	1回										
水田作物 (水田畦畔)	水田畦畔	一年生雑草 多年生雑草	収穫7日前まで (雑草生育期: 草丈30cm以下)	500～ 1000mℓ /10a	2回以内	2回以内							
水田作物 畑作物 (休耕田)	休耕田	雑草生育期 (草丈50cm以下)	3回以内				3回以内						
水田作物 (水田刈跡)	水田刈跡		雑草生育期	300～ 500mℓ /10a	1回	1回							
セルリー	一年生雑草	収穫7日前まで (雑草生育期 定植前又は 畦間処理)	3回以内				3回以内						
さんしょう (果実)	多年生雑草	収穫7日前まで (雑草生育期: 草丈30cm以下)						2回以内	2回以内				

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グルホシネート及びグルホシネートPを含む農薬の総使用回数		
				薬量	希釈水量					
しそ (花穂)	—	一年生雑草	収穫14日前まで (雑草生育期 定植前又は 畦間処理)	300～ 500mℓ /10a	100～ 150ℓ /10a	2回以内	雑草 茎葉 散布	2回以内		
食用桑(葉) 食用桑(果実)			収穫45日前まで (雑草生育期 春期萌芽前及び 夏切り後萌芽前)			3回以内		3回以内		
パセリ			収穫3日前まで (雑草生育期 定植前又は 畦間処理)			2回以内		2回以内		
もりあざみ			収穫30日前まで (雑草生育期 は種前又は 畦間処理)			3回以内		3回以内		
ふき			収穫120日前まで (雑草生育期 定植前又は 畦間処理)			2回以内		2回以内		
ふき (ふきのとう)			収穫75日前まで (雑草生育期 定植前又は 畦間処理)			2回以内		2回以内		
たけのこ			収穫30日前まで (雑草生育期: 草丈30cm以下)			3回以内		1回	2回以内	3回以内
たらのき			収穫45日前まで (雑草生育期: 植付前又は 畦間処理)							
なたね			収穫30日前まで (雑草生育期: は種前又は 畦間処理)							
茶			摘採7日前まで (雑草生育期 畦間処理)							
花き類・ 観葉植物			雑草生育期 畦間処理 (草丈20cm以下)							
樹木類			雑草生育期							

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グルホシネート及びグルホシネートPを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
樹木等	公園 庭園 堤とう 駐車場 道路 運動場 宅地 のり面 鉄道等	一年生雑草	雑草生育期	500～ 1000mℓ /10a	100～ 200ℓ /10a	3回以内	植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布	3回以内
		多年生雑草		1000～ 2000mℓ /10a				
日本芝 (こうらいしば)	—	一年生雑草	雑草生育期 芝休眠期	300～ 500mℓ /10a	100～ 150ℓ /10a	1回	雑草茎葉散布	1回
たばこ			植付10日前まで (雑草生育期)	200～ 300mℓ /10a				
			大土寄期 (雑草生育期 畦面・畦間処理)					
桑			雑草生育期 春期萌芽前及び 夏切り後萌芽前					
とうき			収穫30日前まで (雑草生育期 定植前又は 畦間処理)	300～ 500mℓ /10a				
とうき(葉)	収穫7日前まで (雑草生育期 定植前又は 畦間処理)							

マイナー作物等の登録拡大に伴いグループ化した作物名

グループ化した作物名	含まれる作物(品種)
小粒核果類	あんず、うめ、すもも
とうがらし類	甘長とうがらし、かぐらなんばん、きだちとうがらし、ししとう、とうがらし、ハバネロ、ピカンテ
非結球レタス	かきちしゃ、サラダ菜、立ちちしゃ、美味タス、リーフレタス
豆類(種実)	あずき、いんげんまめ、えんどうまめ、ささげ、そらまめ、だいず、なたまめ、ふじまめ、べにばないんげん、らっかせい
なばな類	あさまこな、あすっこ、アレッタ、おおさきな、太田かぶ、オータムポエム、大月菜、大野菜、かいらん、かきな、勝山水菜、くきたちな、ケールッコラ(なばな栽培)、こうさいたい、こまつな(なばな栽培)、さいしん、三景雪菜、四川児菜、たべたい菜、チーマデラーパ、チンゲンサイ(なばな栽培)、チンゲンルッコラ(なばな栽培)、摘菜花、つぼみな、なばな、のらぼうな、博多蕾菜、はくさい(なばな栽培)、はたけな(なばな栽培)、はなっこりー、みずかけな、めいけな

農業登録における作物群の作物名について(2019年4月1日改正)
「農薬の適用病害虫の範囲および使用方法に係る適用作物等の名称について」(2019年3月29日付け30消安第6281号農林水産省消費・安全局農産安全管理課長通知)農林水産消費安全技術センターホームページをご参照ください。
<http://www.acis.famic.go.jp/shinsei/6281.pdf>

表の使用に際しては以下の事項に留意してください。
注1 現在、農薬の適用作物には含まれていない作物を含みます。適用作物に含まれていない作物については、農業登録時にその名称が変更される場合があります。
注2 品種名及び栽培条件(施設栽培等)等については省略している場合がありますが、農業登録時に品種名又は栽培条件等の指定がある場合は、当該品種又は栽培条件等のみ使用できるものです。